



**Oiseaux**  
des jardins

# Fiches Confusion

*Les oiseaux des jardins*



Georg Wieteschörke - Pixabay



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ

# Sommaire




<u>Bruant jaune / Bruant zizi (femelle) .....</u>	<u>3</u>
<u>Bruant jaune / Bruant zizi (mâle) .....</u>	<u>4</u>
<u>Corvidés .....</u>	<u>5</u>
<u>Fauvettes .....</u>	<u>6</u>
<u>Fauvette à tête noire / Mésange nonnette .....</u>	<u>7</u>
<u>Gobemouche gris / Rougequeue noir (femelle) / Fauvette à tête noire.....</u>	<u>8</u>
<u>Grive musicienne / Grive draine .....</u>	<u>9</u>
<u>Grives / Merle (femelle) .....</u>	<u>10</u>
<u>Hirondelles .....</u>	<u>11</u>
<u>Mésange charbonnière/ Mésange noire / Mésange nonnette .....</u>	<u>12</u>
<u>Moineau domestique / Accenteur mouchet .....</u>	<u>13</u>
<u>Moineau friquet / Moineau domestique .....</u>	<u>14</u>
<u>Pinson des arbres / Pinson du Nord / Bouvreuil pivoine .....</u>	<u>15</u>
<u>Roitelets.....</u>	<u>16</u>
<u>Roitelet à triple bandeaux / Pouillot véloce / Troglodyte mignon .....</u>	<u>17</u>
<u>Roitelet huppé / Pouillot véloce / Troglodyte mignon .....</u>	<u>18</u>
<u>Rouge queue noir (femelle) / Fauvette des jardins .....</u>	<u>19</u>
<u>Rougequeue à front blanc / Rougequeue noir (femelles) .....</u>	<u>20</u>



# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Bruant jaune


Femelle



La femelle du **Bruant jaune** possède ressemble à la femelle du Bruant zizi. Elle présente un plumage **teinté de jaune**, notamment au niveau de la tête et du ventre, et un **croupion roux**.

## Bruant zizi

Femelle




La femelle de **Bruant zizi** est plus terne, moins jaune que celle du Bruant jaune, mais **la différence reste subtile**. Seul le **croupion gris-olive** des femelles de Bruant zizi (et non roux) permet de bien les différencier.



# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Bruant jaune


### Mâle



Le **Bruant jaune** porte bien son nom. La caractéristique principale du mâle est la **tête jaune vif jusqu'à la gorge**. Sa poitrine **jaune striée de roux et d'olive** est beaucoup moins marquée que chez le Bruant zizi. Le plumage du dos est **brun et noir** tandis qu'il comporte une dominante rousse chez le Bruant zizi.

## Bruant zizi

### Mâle



Le mâle du **Bruant zizi** est reconnaissable à son **masque facial noir** ainsi qu'à la couleur de la tête mais aussi à celle de la poitrine, aux **couleurs franches** (vert-olive bordée de roux). On retrouve les mêmes couleurs sur la poitrine du Bruant jaune mais plus estompées et mélangées.




# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Corneille noire Mâle et femelle



La corneille noire est la **plus grande** des trois espèces dont elle se distingue par son bec **épais et sombre**. Son plumage est **noir** avec des **reflets bleu-vert**. Comme le **Choucas des Tours**, elle visite volontiers les **villes**, contrairement au **Corbeau freux**, plus campagnard

## Choucas des tours Mâle et femelle



Le choucas des tours est le **plus petits** des trois espèces. Il est reconnaissable à sa **tête grise**, ses **yeux clairs**, son **masque noir** et son **bec court**. Son allure est **plus « ramassée »** que celle des deux autres. Les reflets de son plumage sont plus clairs et **gris bleutés** au niveau de la tête. Il pousse des **cris aigus** caractéristiques.

## Corbeau freux Mâle et femelle




Le corbeau freux se distingue par son **bec long et droit pâle et dépourvu de plumes à la base** (contrairement aux deux autres). Son plumage est **noir** avec des **reflets violacés**.



# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Fauvette à tête noire


### Mâle et femelle



La Fauvette à tête noire est une espèce courante dans nos jardins, bien que discrète. Proche de la Fauvette des jardins, elle s'en distingue par la présence d'une **calotte noire** chez le mâle ou **rousse** chez la femelle.

## Fauvette des jardins

### Mâle et femelle




La fauvette des jardins n'a **pas de signes distinctifs particuliers**. Malgré son nom, cette espèce **ne vit pas dans les jardins**. Elle apprécie plutôt les sous-bois frais et les lisières ombrées et humides. Migratrice, elle revient en France à partir du 15 avril.



# ATTENTION AUX CONFUSIONS ENTRE...

## Fauvette à tête noire


### Mâle



Par sa **calotte noire** (rousse chez la femelle), le mâle de **Fauvette à tête noire** ressemble à la **Mésange nonnette**. Toutes deux sont fréquentes dans les jardins mais la fauvette est **plus discrète**. Elle est aussi **plus grande**, ses **joues** sont **grises**, son bec est **long et fin** et sa **calotte s'arrête au dessus de l'œil**.

## Mésange nonnette

### Mâle et femelle



La présence d'une **bavette noire** sous le bec est le meilleur critère pour distinguer la **Mésange nonnette** de la **F. à tête noire**. La **calotte noire** de la **M. nonnette** est **plus étendue vers l'arrière de la tête et recouvre l'œil**. Et, contrairement à la **F. à tête noire**, ses **joues** sont **blanches**, son bec est **court** et **les deux sexes sont identiques**.




# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...



## Gobemouche gris


Mâle et femelle



Oiseau forestier migrateur, présent en France à partir de la mi-avril, le Gobemouche gris se reconnaît à sa gorge et sa poitrine blanc-grisâtre parsemées de **stries noires bien nettes** et à son **plumage gris souris**. Cette couleur et une **barre alaire blanche** le distingue du rougequeue noir au plumage gris-brun homogène et de la fauvette à la teinte globalement beige-chamois.

## Rougequeue noir

Femelle




La femelle rougequeue noir se distingue du Gobemouche gris par son **plumage globalement gris-brun** sans stries marquées et par **sa queue rousse bien visible**. Contrairement au gobemouche gris et à la fauvette des jardins, le Rouge queue noir est une espèce fréquente dans les jardins.



## Fauvette des jardins

Mâle et femelle



La teinte générale de son plumage, plus claire sur le ventre, tire sur le **beige-chamois**. **Contrairement** aux deux autres espèces **elle n'a aucun signe distinctif**. Comme le Gobemouche gris, la Fauvette des jardins est une espèce migratrice rarement observée dans les jardins. Elle apprécie plutôt les sous-bois frais et les lisières ombrées et humides.






# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Grive musicienne


Mâle et femelle



Un peu plus petite qu'un merle, la Grive musicienne ressemble à la Grive draine dans son aspect mais s'en distingue nettement par **sa taille** (plus petite), par la forme **de ses tâches ventrales (gouttes ou cœurs renversés)** ainsi que par la **coloration chaude, brun-chamois**, de son **dos**.

## Grive draine

Mâle et femelle



La Grive draine est la **plus grande** des grives (plus grosse qu'un merle). C'est une espèce forestière, qui fréquente aussi les bosquets en zone agricole et dédaigne les zones très urbanisées. Plus fréquente dans les jardins en hiver qu'en été, vous la reconnaîtrez grâce à **ses tâches noires rondes épaisses**, à son **dos gris-brun clair** et à sa **longue queue**.




# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Grive musicienne

### Mâle et femelle

Dos brun-chamois




Tâches en forme de gouttes ou de cœurs renversé

Un peu plus petite qu'un merle, la Grive musicienne ressemble à la Grive draine dans son aspect mais s'en distingue nettement par **sa taille** (plus petite), par la forme de **ses tâches ventrales (gouttes ou cœurs renversés)** ainsi que par la **coloration chaude, brun-chamois, de son dos.**

## Grive draine

### Mâle et femelle

Dos brun-gris




Tâches rondes

La Grive draine est la **plus grande** des grives (plus grosse qu'un merle). C'est une espèce forestière, qui fréquente aussi les bosquets en zone agricole et dédaigne les zones très urbanisées. Plus fréquente dans les jardins en hiver qu'en été, vous la reconnaîtrez grâce à **ses tâches noires rondes épaisses**, à son **dos gris-brun clair** et à sa **longue queue.**

## Merle noir

### Femelle

Plumage brun



Ventre sombre, avec parfois des tâches diffuses


La « merlette », femelle du merle, est **brune** avec un **bec sombre**. Sa **gorge est plus claire**, et **son ventre est sombre**. On y distingue parfois des tâches, mais son ventre ne sera jamais aussi contrasté que celui des grives. Elle est présente dans les jardins **toute l'année.**



# ATTENTION AUX CONFUSIONS ENTRE...

## Hirondelle rustique


### Mâle et femelle



L'Hirondelle rustique est souvent la première à revenir d'Afrique. Sa silhouette est caractéristique avec sa **queue munie de longs filets**. Sa **face est rouge**, et son **croupion est bleu foncé**, ce qui la distingue de l'Hirondelle de fenêtre.

## Hirondelle des fenêtres

### Mâle et femelle



L'Hirondelle de fenêtre ressemble à sa cousine l'Hirondelle rustique, mais chez elle le **croupion et la gorge sont blancs**. La queue est **fourchue** mais dépourvue de filets.




# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...



## Mésange noire


### Mâle et femelle



Très rare dans les jardins, car forestière, la Mésange noire se distingue de la charbonnière par sa petite taille, l'absence de couleur vive dans son plumage (gris sur le dos, ailes striées de 2 bandes blanches) et par la présence d'une **tâche blanche sur la nuque**. Sa bavette noire est **large** contrairement à celle de la M. nonnette.

## Mésange nonnette


### Mâle et femelle



La Mésange nonnette est reconnaissable à la couleur **brun uni** sur le dos et les ailes, ainsi qu'à sa **petite bavette noire**. Si vous pensez en voir une, n'hésitez pas à prendre une photo, car il pourrait s'agir d'une **Mésange boréale**, espèce qui lui ressemble énormément.

## Mésange charbonnière

### Mâle et femelle



La Mésange charbonnière est une des espèces les plus courantes de nos jardins. La **bande noire sur son ventre**, les teintes **jaunes et verts** sur le dos sont caractéristiques de cette espèce.




# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Moineau domestique

### Mâle

Calotte et nuque grises




Quelle que soit la saison, vous reconnaîtrez le Moineau domestique mâle grâce à sa **calotte et nuque grises**, ainsi que sa **joue blanchâtre sans tâche noire**. En revanche, son plumage varie légèrement avec les saisons, notamment au niveau de la taille de la bavette tachetée de noir sur sa gorge.

## Moineau domestique

### Femelle

Sourcil clair marqué




Corps globalement plus terne

Le Moineau domestique femelle arbore un plumage très différent du mâle, mais vous les croiserez souvent ensemble. La différence se fait sur l'ensemble du plumage, la femelle étant globalement plus **terne**, avec un **sourcil clair marqué** et un **bec brun clair**.

## Accenteur mouchet

### Mâle et Femelle

Bec fin



Tête et ventre gris-bleu

Le plumage de l'Accenteur mouchet rappelle celui des moineaux, mais il est globalement plus sombre et **plus rayé**. Il arbore également une **tête et un ventre gris-bleuté**, ainsi qu'un **bec fin**. C'est un oiseau discret, mais visible toute l'année.




# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...



## Moineau friquet

Mâle et femelle

Calotte et nuque marron




Tâche noire sur la joue

Contrairement au Moineau domestique, le Moineau friquet n'est pas très courant dans les jardins. Si vous pensez en voir un, vérifiez bien qu'il possède une **tâche noire sur la joue**, un collier blanc presque entier ainsi qu'une calotte et une nuque marron. Hiver comme été, **le mâle et la femelle sont identiques**.

## Moineau domestique

Mâle

Calotte et nuque grises




Quelle que soit la saison, vous reconnaîtrez le Moineau domestique mâle grâce à sa **calotte et nuque grises**, ainsi que sa joue **blanchâtre sans tâche noire**. En revanche, son plumage varie légèrement avec les saisons, notamment au niveau de la taille de la bavette tachetée de noir sur sa gorge.

## Moineau domestique

Femelle

Sourcil clair marqué



Corps globalement plus terne


Le Moineau domestique femelle arbore un plumage très différent du mâle, mais vous les croiserez souvent ensemble. La différence se fait sur l'ensemble du plumage, la femelle étant globalement plus **terne**, avec un **sourcil clair marqué** et un **bec brun clair**.



# ATTENTION AUX CONFUSIONS ENTRE...




## Pinson des arbres




Le Pinson des arbres a une coloration **rouge** (brune chez la femelle), un **dos brun-roux** ainsi que des **barres alaires marquées**. Contrairement à la femelle, le mâle possède une **calotte bleue**. Ils ont un **croupion vert-olive**.

## Pinson du Nord



Le Pinson du Nord présente un plumage globalement **orange**, plus marqué chez le mâle que chez la femelle. Contrairement au Pinson des arbres, la **tête du mâle est brune, noire et grise** (brune chez la femelle). Ils ont un **croupion blanc**.

## Bouvreuil pivoine



Contrairement aux pinsons, le Bouvreuil pivoine possède un **dos gris**, ainsi qu'un **casque noir**. Son **bec, de la même couleur**, est **très court et arrondi**. Le ventre du mâle est d'un **rouge très vif**, tandis que celui de la femelle est de couleur **gris-beige**.



# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Roitelet à triple-bandeaux

Mâle et femelle



Le Roitelet à triple-bandeaux possède un **sourcil blanc** et un **trait noir sur l'œil** caractéristique. C'est ce qui permet de le différencier du **Roitelet huppé**. Chez les deux espèces, le plumage est **verdâtre sur le dos**, le dessous est brun olive et les ailes sombres.

## Roitelet huppé

Mâle et femelle



Pour différencier le Roitelet huppé du Roitelet à triple bandeau il faut regarder le détail de sa tête. Il ne possède **pas de trait noir sur l'œil ni de sourcil blanc**. Posé, il **relève sa queue** comme le fait le Troglodyte contrairement au Roitelet à triple bandeau.






# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Roitelet huppé

Mâle et femelle

Dos verdâtre et ailes vertes avec une tache noire



Bandeau noir et jaune (avec une pointe orangée chez les ♂)


Le Roitelet huppé possède un **plumage verdâtre sur le dos et des ailes sombres avec deux barres alaires blanches**. C'est surtout le détail de sa calotte qui permet de l'identifier avec ses **bandeaux jaunes et noirs**. Posé, il porte sa **queue relevée** comme le Troglodyte.

## Pouillot véloce

Mâle et femelle

Sourcil blanc léger parfois invisible

Dos brun olive




Ailes unies

Le plumage **brun olive** du Pouillot véloce peut parfois avoir des reflets verdâtres, d'où la confusion possible avec le R. huppé. Toutefois chez le P. véloce les **ailes sont unies**. Vu de dessous en revanche la confusion est possible car la couleur du ventre est similaire avec celle du R. huppé.

## Troglodyte mignon

Mâle et femelle

Dos et ailes brun rayé de noir



Queue courte et relevée


C'est à la couleur caractéristique du **dos** (brun-roux) et des **ailes** (brun-roux rayées de noir) que l'on peut facilement identifier le Troglodyte mignon. Le Troglodyte n'a pas de barre alaire blanche comme le R. huppé. Posé, il **relève systématiquement la queue** comme peut le faire parfois le R. huppé.



# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Roitelet à triple-bandeaux


### Mâle et femelle



Le Roitelet à triple-bandeaux (RTB) possède un **sourcil blanc** et un **trait noir sur l'œil** caractéristique. Le plumage du dos est **verdâtre** et les **ailes** sont **contrastées**. C'est ce qui permet de le différencier du Pouillot véloce et du Troglodyte mignon. De plus, lorsqu'il est posé, il **ne relève pas la queue** comme ce dernier.

## Pouillot véloce


### Mâle et femelle



Le Pouillot véloce porte un **brun olive** tirant parfois sur le vert ce qui peut le faire ressembler au RTB mais il ne possède **pas les couleurs jaune, noire et blanche caractéristiques de la calotte**. Les ailes sont **unies** contrairement au RTB. Il ne relève pas la queue comme le Troglodyte.

## Troglodyte mignon

### Mâle et femelle




C'est plutôt par la couleur du **dos** (brun roux) et des **ailes** (brun-roux rayées de noir) que l'on peut facilement différencier le Troglodyte mignon du RTB et du Pouillot véloce. Posé, il **relève la queue**. Le **sourcil blanc est beaucoup plus marqué** chez le RTB.



# ATTENTION AUX CONFUSIONS ENTRE...

## Rougequeue noir

### Femelle




Présent toute l'année dans l'Ouest de la France, et visiteur estival dans l'Est du pays, le Rougequeue noir apprécie les jardins.

Plus claire que le mâle, la femelle du Rougequeue noir possède un **plumage gris-brun** et une **queue rousse** parfois peu visible.



## Fauvette des jardins

### Mâle et Femelle




Beige-chamois délavé, plus pâle sous le ventre.... Cette espèce n'a **pas de signes distinctifs particuliers**. Malgré son nom, cette fauvette **ne vit pas dans les jardins**. Elle apprécie plutôt les sous-bois frais et les lisières ombragées et humides. Migratrice, elle revient en France à partir du 15 avril.



# ATTENTION AUX **CONFUSIONS** ENTRE...

## Rougequeue noir

### Femelle




Plus claire que le mâle, la femelle Rougequeue noir possède un **plumage gris-brun** et une **queue rouge**.

Très proche de sa cousine la femelle Rougequeue à front blanc, elle s'en différencie par son **plumage uniforme**: son **ventre de la même teinte que son dos**.

## Rougequeue à front blanc

### Femelle



Visiteur d'été, le Rougequeue à front blanc fait son arrivée en avril.

La femelle est reconnaissable à son **dos brun** et à son **ventre plus clair aux teintes blanches et chamois-roux**. Elle possède également une **queue rouge**.